

สำรหน้ารู้

โรคไข้เลือดออก

คือ โรคติดเชื้อที่มี **ยุงลาย** เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก โดยอาการของโรคนี้นี้ มีความคล้ายคลึงกับ **โรคไข้หวัดใหญ่** ในช่วงแรก จึงทำให้ผู้ป่วยเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าเป็นเพียงโรคไข้หวัดใหญ่ และทำให้ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องในทันที

อาการ

ไข้สูง ปวดตามตัว
อ่อนเพลีย ซึม

รับประทานอาหารไม่ได้
อาเจียน ปวดท้อง

มีเลือดออก
ตามอวัยวะต่างๆ

หากอาการหนัก
มีภาวะช็อก
และเสียชีวิต

การป้องกัน



กำจัดทำลายแหล่ง
เพาะพันธุ์



นอนในมุ้ง
ใช้ยากันยุง



ไปพบแพทย์ เมื่อป่วย เป็นไข้
และปฏิบัติตามคำแนะนำ



เตรียมความพร้อมรับมือโรคไข้เลือดออก

ป้องกันยุงลาย ห่างไกล ไข้เลือดออก



PSU คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยวังนันทน์



โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อไวรัสเดงกี (Dengue virus) ที่มียุงลาย เพศเมียเป็นพาหะนำโรคพบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

สังเกตอาการ



อาจมีผื่นหรือจุดเลือดออกตามลำตัว



ไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส



เบื่ออาหาร อาเจียน



ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว
อ่อนเพลีย

วิธีป้องกัน



ใส่เสื้อผ้าปกคลุมร่างกาย
หรือนอนในมุ้ง



ใช้ยาฉีดหรือยาทาที่มุง



ฉีดวัคซีนป้องกัน
ไข้เลือดออก



ระบายน้ำขัง

คำแนะนำเพิ่มเติม : วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ

- วัคซีน Dengvaxia® ควรฉีดในผู้ที่มีอายุ 6-45 ปี และเคยเป็นไข้เลือดออกแล้ว
- วัคซีน Qdenga® สามารถฉีดในผู้ที่มีอายุ 4-60 ปี ที่เคยหรือไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน